



RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.

1540 W. Thorndale Avenue,

Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com



RelianceOrthodontics.com



ITC TRANSLATIONS

ITC USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440

Palm Beach Gardens, FL 33408



EC REP

ITC

USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440

Palm Beach Gardens, FL 33408



REP

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: The Perfect-A Smile® Pontic Putty is intended for use as a light cure coloring agent of thermoplastic aligners.

This patented formula works with clear thermoforming aligner plastics.

Contraindication: Perfect A Smile is not recommended for use with cloudy, (C) thermoforming materials.

1. To ensure uniformity due to settlement of the product, mix the pontic putty thoroughly with a spatula until uniform. **PRODUCT MUST BE MIXED BEFORE EACH USE.**

2. Remove the amount desired and place on mixing pad. **IMMEDIATELY REPLACE THE LID TO PROTECT FROM LIGHT.**

3. Apply 3 coats of the pontic paint with a microbrush. Light cure for 10 seconds after each coat. **NOTE: Shades can be mixed ON A MIXING PAD to achieve different shades.**

4. After final coat is applied and light cured, perform a final light cure through the aligner for 20 seconds from the labial and lingual surfaces.

Please Note: For the most accurate shade matching, fabricate a shade guide by placing 3 coats of each shade to individual tooth surfaces. This shade guide should be fabricated from the same clear aligner material being used.

☼☼☼ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. **DO NOT INHALE FUMES. USE IN A WELL VENTILATED AREA.**

☼ Dispose of this device/container properly. Marine hazard.

MicroBrush applicators are single use devices. It is required that a new microbrush applicator is used for each application.

Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

TEMPERATURE LIMITATION: Store at room temperature (15-25°C).

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff

PATIENT POPULATION: The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

CONTRAINDICATIONS: Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

SAFE DISPOSAL: Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous- waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

CREATING A TEMPORARY TOOTH ON A STONE MODEL

Roll approximately ½ gram of Perfect A Smile® Pontic Putty between your thumb and index finger.

Place roll of composite on gingival surface of the missing tooth socket and lightly depress ball of composite between thumb and index to produce incisal height slightly shorter than adjacent teeth*. Precise shaping of the incisal, mesial and distal can be done with an instrument. Light Cure for 30 seconds from 2 (two) angles.

Fluctured or worn teeth can be repaired or altered in shape with Perfect A Smile® Pontic Putty Paste.

***IMPORTANT!** For a single pontic tooth on the model, create the incisal edge slightly shorter (approx. 0.5mm) than the adjacent teeth. This compensates for the thickness of the aligner material on the facial surface of the adjacent teeth once the aligner socket is painted.

For multiple or adjacent teeth, (for an exact match), form the pontic tooth on the model to the exact incisal height of adjacent teeth. To allow room for the paint on existing teeth in the aligner socket, apply a thin coat of FlowTain™ on the facial surfaces of adjacent teeth - similar to the protocol for bleaching relief voids in bleaching trays.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

REORDER INFORMATION: #PPA1, #PPA2, #PPA35, #PPB1, #PPC1, #PPC4, #PPFD3, #PPFL, #PPASL, #PASM, #LBOPS

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ: Да се съхранява на стайна температура (15-25°С).

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ: Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтико лечение съгласно посоченото от клиничистите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуваща зъбни заболявания (напр. декалцификация, карисни лезии, големи реставрации) може да повлияе качеството от уредване на зъбите.

БЕЗОПАСНО ИЗВЪРЛЯНЕ: Извървяляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на отпадъци или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител с обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, пряки или последици, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДИПИСАНИЕ: Федералния закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ ВЪРХУ КАМЕНЕН МОДЕЛ

Размесете около половин грам pontic-ен пластилин Perfect A Smile ® между палеца и показалеца. Поставете точче композит върху гингивалната повърхност на липсващото зъбно гнездо и леко натиснете томчето композит между палеца и показалеца, да да се получи височина на инцизия, малко по-къса от съседните зъби *. Прецизното оформяне на инцизията, мезиално и дистално, може да се направи с инструмент.

Втърчете леко за 30 секунди от 2 (два) ъгъла.

Нагуканите или износените зъби може да се поправят или да се промени формата им с помощта на пластилиновата pontична паста Perfect A Smile®.

***ВАЖНО!** За единичен pontичен зъб на модела създайте инцизир ръб малко по-къс (приблизително 0,5 mm) от съседните зъби. Това компенсира дебелината на материала за подравняване на лицевата повърхност на съседните зъби след боядисване на гнездото на подравняване.

За множество или износени зъби може да се оформят оформете pontичния зъб на модела до точната инцизна височина на съседните зъби. За да оставите място за боя върху съществуващите зъби в гнездото на подравняване, нанесете тънък слой FlowTain™ върху лицевите повърхности на съдени зъби - подобно на протокола за избелване на релiefни кухини в избелващи тапи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живее.

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

PERFECT A SMILE® PONTIC ALIGNER PAINT

Mezi palce a ukazováčkem vyválejte přibližně ½ gramu tmeľu na mý

Les dents fracturées ou usées peuvent être réparées ou réparoñées grâce à la pâte de ciment pontique Perfect A Smile®.

***IMPORTANT!** Pour une seule dent pontique sur le moule, creser le bord incisif légèrement plus court (environ 0,5 mm) que les dents adjacentes. Cela permet de compenser l'épaisseur du matériau de la gouttière sur la surface faciale des dents adjacentes une fois l'alvéole de gouttière peinte.

Pour les dents multiples ou adjacentes, (pour une correspondance exacte), former la dent pontique sur le moule à la hauteur incisale exacte des dents adjacentes. Pour laisser de la place à la peinture sur les dents existantes dans l'alvéole de gouttière, appliquer une fine couche de FlowTain™ sur les surfaces faciales des dents adjacentes - simlifier au protocole de blanchiment des vides de relief dans les gouttières de blanchiment.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou la patient(e) sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJA ZA UPOTREBU: Ponična boja Perfect A-Smile® služi kao sredstvo za bojenje kod svjetlosnog učvršćivanja termoplastičnih naprava za poravnavanje.

Ova patentirana formula djeluje s prozinom termoformiranoam plastikom za aparate.

Kontraindikacija: Perfect A Smile se ne preporučuje za upotrebu s neprozirnim (C) termoformiranim materijalima.

1. Da biste osigurali ujednačenost uslijed stabiliziranja proizvoda, pontičnu boju temeljito umiješajte lopaticom da bude ujednačena. PROIZVOD SE MIJEŠA PRIJE SVAKE UPOTREBE.

2. Uzimate željenu količinu i stavite na podlogu za miješanje. **ODMAH ZATVORITE POKLOPCOM DA PROIZVOD OD SVJETLA**

3. Mikročestice nanese 3 sja polna pontične boje. Nakon svakog nanošenja tretirajte svjetlošću 10 sekundi radi učvršćivanja. **NAPOMENA: Nijanse se mogu miješati na PODLOZI ZA MIJEŠANJE kako bi se postigle različite nijanse.**

4. Nakon nanošenja završnog sloja i svjetlosnog učvršćivanja, izvršite konačno svjetlosno učvršćivanje preko naprave za poravnanje u trajanju od 20 sekundi s labijalne i lingvalne površine.

Napomena: Radi postizanja najpreciznijeg usklađivanja nijansi napravite vodič nijansi stavljanjem 3 sloja svake nijanse u pojedinačna zubna mjesta. Ovaj vodič za nijanse treba biti izraden od istog prozirnog materijala koji se koristi.

☺☺☺ **MJERE OPREZA:** Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Kontakt s ostalim tkivima: područje izlijevanje odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. **NE UDIŠITE ISPARAVANJA. KORISTITE U DOBRO PROZRAČENOM PROSTORU.**

☺ Odložite ovaj proizvod/spremnik na pravilan način. Opasno za morske organizme.

Aplikatori MicroBrush su namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Potrebno je koristiti novi aplikator mikročestice za svaku primjenu.

Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

OGRAĐENIJE TEMPERATURE: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C).

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

POPULACIJA PACIJENATA: Previdena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

KONTRAINDIKACIJE: Privršćivanje dokataka za pacijente s uzgrozenim imunitet zdravljem, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojeća dentalna infekcija (tj. dekalifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD: Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne- opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products Inc. prihvaća odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravnan ili posredičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sa rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savetnik zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili pu njihovom natogu.

IZRADA PRIVREMENOG ZUBA NA KAMENOM MODELU
Uvajte otplrike ½ grama paste Perfect A Smile® Pontic Putty između palca i kažiprsta.
Postavite kolut kompozita na gingivalnu površinu mjesta zuba koji nedostaje i lagano pritisnite kuglicu kompozitnog materijala između palca i kažiprsta da postignete incizalnu visinu koja je nešto kraća od susjednih zuba*. Precizno oblikovanje incizalnog, mesjalnog i distalnog zuba se obaviu instrumentom.
Provodite svjetlosno učvršćivanje u trajanju od 30 sekundi iz 2 (dva) kuta.

Polimijene ili istrošene zube moguće je popraviti ili promijeniti im oblik pomoću paste Perfect A Smile® Pontic Putty.
***VAŽNO!** Za jedan pontični zub na modelu napravite incizalni rub malo kraći (približno 0,5 mm) od susjednih zuba. Ovo kompenzira debilnu materijala aparata koji se postavljaju na površnu licu susjednih zuba nakon što se oboji mješom umetanja na aparatu.
Za više zuba ili susjedne zube (za točno podudaranje) oblikujte pontični zub na modelu do točne incizalne visine susjednih zuba. Da biste ostavili prostor za boju na postojećim zubima u mjestu umetanja na aparatu, naneseite tanki sloj proizvoda FlowTain™ na površine lica susjednih zuba - slično protokolu za izbjeljivanje reljefnih praznina u podmetačima za izbjeljivanje.

OBAVIJEŠT: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A Perfect A Smile® hidtest festék a termoplasztikus alginernek fényre kötő szinezőanyagként alkalmazható.

Ez a szabadalmaztatott formula átítászó hőre formázható alginer műanyagokkal működik.
Elenjavallat: A Perfect A Smile alkalmazása nem ajánlott opálás,

(C) hőre formázható anyagokhoz.

1. A termék lerakódása miatt az egyenműség biztosítása érdekében alaposan keverje össze egy spatulával a hidtestfestéket, amíg az egyenmő nem lesz. A TERMEKET MINDEN HASZNÁLÁT ELŐTT ÖSSZE KELL KEVERNİ.
2. Adagolja ki a kívánt mennyiséget és helyezze a keverőlapra. A **FÉNYTŐL VALÓ VÉDELME ERDEKÉBEN AZONNAL HELYEZZE VISSZA A FEDELET.**

3. Vigyen fel 3 réteg hidtestéket egy mikrocsettel. Minden réteg után 10 másodpercig fotopolimerizáljon. **MEGLYÖZÉS: A külbőző árnyalatok elérésé érdekében az árnyalatok keverhetők a KEVERŐLAPON.**

4. Az utolsó réteg felvitelét és a fotopolimerizációját követően végezzen az algineren keresztül egy utolsó, 20 másodpercig tartó fotopolimerizációt a labiális és a lingvális felületek felé.

Kérjük, vegye figyelembe: A lehető legpontosab színárnyalat egyezés érdekében készítsen egy színkálát, az egyes árnyalatok 3 rétegének az egyes fűgűregekbe történő felvitelével. A színkálát ugyanabban a felhasználásra kerűlő átítászó alginer anyagból készíteni.

☺☺☺ **ÖVINTÉZÉSEKÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bővígőse mennyiségű vízzel. **NE LÉLEGZZE BE A GŐZT. JÓL SZELLŐZŐ HELYSÉGBEN HASZNÁLJA.**

☺ Ártalmatlanság megfelellően a készülék/tartályt. Tengeri élővilágra veszélyes.
A MicroBrush aplikátorok egyszer használatos eszközök. Minden alkalmazásához új mikro-applikátortesteket kell használni.
Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegnek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelellően kialakított védőszemüveget kell viselnie.

HŐMÉRÉSKETKORLÁTOZÁS: Szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolandó.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

BETEGCSOPORT: A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelése van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

ELLENJAVALLATOK: A fogak károsodásának kockázata, például rossz szájhigiénával, fogágybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalifikáció, fennvalv elváltozások, nagy fogpótlások) rendelkező betegeknél szűzáló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANSÍTÁS: A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelellően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok elármaltatásának megfelelően rendelkezni vállalkozó végzettheti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az űres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlaníthatók.

GARANCIJA: A Reliance Orthodontic Products Inc. felelősségét vállal a hibásnak bizonyuló termékekért. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetven vagy következményes kártért vagy veszteségért, amely a termékeknek a leíratak szerinti felhasználásából vagy a helyes használat képességének hiányából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározásába, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetés szerinti felhasználásra. Ezzel kapcsolatosan minden kockázat és felelősség a felhasználót terheli.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉVYRE: Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelőnyerve vagy fogszakosor részére értékesíthető.
UDIGLENES FOG ELKÉSZÍTÉSE GIPSZMODELLEN
Sodorjon körülbelül ½ gramm Perfect A Smile ® hidtest gittet a hüvelykujj és az mutatóujj között.
Helyezzen egy kompozit gömböt a hiányzó fog medrének gingivális felszínére és emyhén nyomja meg a hüvelyk és mutató ujja között a labdácskát, hogy annak incizális magasságja kissé rövidebb legyen, mint a szomszédos fogaké*. Az incizális, mezális és diszális részek pontos megformázása egy eszköz segítségével elvégezhető.
Fotopolimerizáljon 30 másodpercig 2 (két) szögblő.

A törtőt vagy kopott fogak javíthatók, illetve alkalú megváltoztatható a Perfect A Smile® hidtest gitt paszta segítségével.
***FONTOSI!** A modell egyetlen hidtest fog esetén a szomszédos fogaknál valamivel (kb. 0,5 mm) kisebb incizális élt hozzon létre. Az alginer űreg befestése után kompenzálja az alginer anyag vastagságát a szomszédos fogak facialis felületén.

Több vagy szomszédos fog esetén (a pontos illeszkedés érdekében) a hidtest fogat a modellben a szomszédos fogak pontos incizális magasságához kell alakítani. Annak érdekében, hogy helyet hagyjon a festéknek az alginer űregben lévő fogakon, vigyen fel egy vékony réteg FlowTain™ terméket a szomszédos fogak facialis felületére - hasonlóan a fehérítőszabonok kiemelését űregeknek fehérítéséhez használt eljárásához.

FELSZÓLTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelellő állam illetékes hatóságáinak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO
La Pasta per verniciatura pontic Perfect A Smile® è destinata all'uso come agente colorante fotopolimerizzabile di allineatori termoplastici.

Questa formula brevettata funziona con allineatori trasparenti termofomati in plastica.

Contraindicazioni: Perfect A Smile non è raccomandato per l'uso con materiali per termoformatura torbidi (Classe C).
1. Per garantire l'uniformità dovuta all'assetamento del prodotto, miscelare accuratamente la vernice per pontic con una spatola fino a ottenere un prodotto uniforme. IL PRODOTTO DEVE ESSERE MISCELATO PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

2. Rimuovere la quantità desiderata e posizionarla sulla tavolettina di miscelatura. **RIPOSIZIONARE IMMEDIATAMENTE IL COPERCHIO PER PROTEGGERE DALLA LUCE.**

3. Applicare 3 strati di pasta per verniciatura per pontic con un microbrush. Fotopolimerizzare per 10 secondi dopo ogni strato. **NOTA: Le sfumature possono essere miscelate su una TAVOLETTA DI MISCELATURA per ottenere diverse tonalità.**
4. Dopo l'applicazione dello strato finale e la fotopolimerizzazione, eseguire una fotopolimerizzazione finale attraverso l'allineatore per 20 secondi dalle superfici labiale e linguale.

Nota bene: Per una corrispondenza cromatica più precisa, fabbricare una scala cromatica posizionando 3 strati di ogni colore sui singoli alveoli dentari. Questa scala cromatica deve essere realizzata con lo stesso materiale trasparente utilizzato per l'allineatore.

☺☺☺ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea e irritazione per contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. **NON INALARE I FUMI. UTILIZZARE IN UN'AREA BEN VENTILATA.**

☺ Sminuire adeguatamente questo dispositivo/contenitore. Nuoce all'ambiente marino.

Gli applicatori MicroBrush sono dispositivi monouso. Per ogni

applicazione è richiesto l'utilizzo di un nuovo applicatore microbrush.

L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

LIMITI DI TEMPERATURA: Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI: La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

CONTRAINDICAZIONI: L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

SMLTAMENTO SICURO: Sminuire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.
SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: QUESTI UNITI LA legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

CREAZIONE DI UN DENTE PROVVISORIO SU UN MODELLO IN PIETRA
Far rotolare circa ½ grammo di Perfect A Smile® Pontic Putty tra il pollice e l'indice.
Posizionare il rotolo di composito sulla superficie gengivale della cavità dentale mancante e premere leggermente la sfera di composito tra il pollice e l'indice per creare un'altrezza incisale leggermente più corta rispetto ai denti adiacenti*. La modellazione precisa dell'incisale, mesiale e distale può essere fatta con uno strumento.

Fotopolimerizzare per 30 secondi da 2 (due) angoli.

Denti fratturati o usurati possono essere riparati o modificati nella forma con Pasta Perfect A Smile® Pontic Putty.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.
***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

CONTRAINDICAZIONI: L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

SMLTAMENTO SICURO: Sminuire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: QUESTI UNITI LA legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

CREAZIONE DI UN DENTE PROVVISORIO SU UN MODELLO IN PIETRA
Far rotolare circa ½ grammo di Perfect A Smile® Pontic Putty tra il pollice e l'indice.
Posizionare il rotolo di composito sulla superficie gengivale della cavità dentale mancante e premere leggermente la sfera di composito tra il pollice e l'indice per creare un'altrezza incisale leggermente più corta rispetto ai denti adiacenti*. La modellazione precisa dell'incisale, mesiale e distale può essere fatta con uno strumento.

Fotopolimerizzare per 30 secondi da 2 (due) angoli.
Denti fratturati o usurati possono essere riparati o modificati nella forma con Pasta Perfect A Smile® Pontic Putty.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

Per denti multipli o adiacenti, (per una corrispondenza esatta), formare il dente pontic sul modello all'altezza incisale esatta dei denti adiacenti. Per lasciare spazio alla vernice sui denti esistenti nell'alveolo dell'allineatore, applicare un strato sottile di FlowTain™ sulle superfici facciali dei denti adiacenti - simile al protocollo per lo sbiancamento dei denti in rilievo nelle mascherine per lo sbiancamento.

***IMPORTANTI!** Per un singolo dente pontic sul modello, creare il bordo incisale leggermente più corto (ca. 0,5 mm) rispetto ai denti adiacenti. Questo compensa lo spessore del materiale dell'allineatore sulla superficie facciale dei denti adiacenti una volta verniciato l'alveolo dell'allineatore.

beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

HET CREËREN VAN EEN TIJDELIJKE TAND OP EEN STENEN MODEL

Rol ongeveer ½ gram Perfect A Smile® Ponsische Plamuur tussen duim en wijsvinger.

Plaats een rol composit op het gingivale oppervlak van de ontbrekende tandholte en druk de bal van composit tussen de diem en de wijsvinger lichtjes in om een incisale hoogte te verkrijgen die iets korter is dan die van de aangrenzende tanden*. Nauwkeurige vormgeving van de incisale, mesiale en distale kan worden gedaan met een instruimnt.

Lichtuitharding gedurende 30 seconden vanuit 2 (twee) hoeken.

Gebroken of versleten tanden kunnen worden gerepareerd of in vorm worden gebracht met Perfect A Smile® Ponsische Plamuur Pasta.

***BELANGRIJK!** In geval van een enkele pontische tand op het model, maakt u de incisale rand iets korter (ca. 0,5 mm) dan de aangrenzende tanden. Dit compenseert de dikte van het uitlijnmateriaal op het faciale oppervlak van de aangrenzende tanden zodra de uitlijnbasis is geschilderd.

Voor meerdere of aangrenzende tanden, (voor een exacte match), vormt u de pontische tand op het model tot de exacte incisale hoogte van de aangrenzende tanden. Om ruimte te laten voor de verf op bestaande tanden in de uitlijnbasis, brengt u een dunne laag FlowTain™ aan op de faciale oppervlakken van aangrenzende tanden - vergelijkbaar met het protocol voor het bleken van rieflekkegaten in bleekbakken.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

OGRAÑENIJE TEMPERATURY: Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne.

POPULACJA PACJENTÓW: Przewidywana populacja pacjentów to pacjenci pediatryczni oraz dorośli, wymagający leczenia ortodontycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.

PRZECIWSKAZANIA: Klejenie ząpów u pacjentów ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, jak na przykład niewystarczająca higiena jamy ustnej, chorobami przyzębia lub istniejącymi wcześniej stomatologicznymi stanami chorobowymi (np. odwapnienie, zmiany próchniczne, duże ubytki) może zwiększyć ryzyko uszkodzenia zębów.

BEZPIECZNA UTYLIZACJA: Zawartość oraz pojemnik należy usuwać, korzystając z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/ lub międzynarodowymi, za pośrednictwem licencjonowanego podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych lub odpowiedniego punktu zbiórki, z wyjątkiem suchych, czystych pojemników, które mogą być utylizowane jako odpady innych niebezpiecznych, w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymiary produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwośi. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub innego specjalistę.

TWORZENIE ZĘBA TYMCZASOWEGO NA MODELU GIPSOWYM
Pomiedzy kciukiem a palcem wskaźniowym zrolować ok. 0,5 g masy Perfect A Smile® Pontic Putty.

Umieścić rolkę kompozytu na powierzchni dziąsła zębodułu brakującego zęba i delikatnie wyścisnąć kulkę kompozytu pomiedzy kciukiem a palcem wskaźniowym, aby uzyskać wysokość sieczna nieco krótszą niż sąsiednie zęby*. Zastosować narzędzie do precyzyjnego kształtowania powierzchni siecznej, mejalnej i distalnej.

Utworzyć światłem przez 30 sekund po 2 (dwoma) kątaami.
Za pomocą masy Perfect A Smile® Pontic Putty można też naprawić zęby złamane lub starte zęby lub zmieniła ich kształt.

W przypadku kilku zębów lub zębów sąsiednich (w celu dokładnego dopasowania) uformować pojedyncze przeszło w modelu o wysokości równej wysokości krawędzi siecznej zębów sąsiednich. Aby pozostawić miejsce na farbę na istniejących zębach w zębodole nakładki, należy ciemną warstwę materiału FlowTain™ na powierzchni przednie zębów, podobnie jak w przypadku protokołu wybielenia ubytków w szyn wybielających.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

konstytucyjni. PRODUKT WYMAGA MIESZANIA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.